



Residência **RP** Pediátrica

Publicação Oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria

ISSN-Online: 2236-6814

Data de Submissão: 02/05/2025

Data de Aprovação: 02/06/2025

RELATO DE CASO

Granulomatose com poliangiite mimetizando infecção fúngica: um relato de caso

Granulomatosis with polyangiitis mimicking fungal infection: a case report

Alice Leite Mesquita¹, Marne Rodrigues Pereira Almeida¹, Caroline Graça de Paiva¹, Sarah Polyane Silva Veloso¹, Alanna Ferreira Alves¹, Silvana Augusta Jacarandá de Faria²

Palavras-chave:

Granulomatose com poliangiite, Fusariose, Anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, Relato de caso.

Resumo

A granulomatose com poliangiite (GPA) é a principal vasculite associada ao anticorpo anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), em que 12,4% dos pacientes manifestam a doença antes dos 18 anos. Este trabalho descreve o caso de uma adolescente do sexo feminino com nódulos pulmonares e subcutâneo inicialmente atribuídos à infecção por fungo *Fusarium* spp. isolado em cultura de lavado brônquico. Após ampla investigação, foram identificadas outras lesões orgânicas (vias áreas superiores, renais, brônquicas), bem como anticorpo ANCA que corroboraram o diagnóstico de vasculite sistêmica pelos critérios EULAR/PRINTO/PRES 2010. Este relato de caso destaca a importância da suspeição do diagnóstico de vasculites em pacientes pediátricos que se manifestem com inflamação sistêmica e comprometimento multiorgânico de causa indeterminada.

Keywords:

Granulomatosis with polyangiitis, *Fusarium* infections, Antibodies, Antineutrophil cytoplasmic, Case reports.

Abstract

Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is the main vasculitis associated with antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA), in which 12.4% of patients develop the disease before age 18. This study describes the case of a female adolescent with pulmonary and subcutaneous nodules initially attributed to infection by the fungus *Fusarium* spp. isolated in bronchial lavage culture. After extensive investigation, other organic lesions (upper airways, renal, bronchial) and ANCA antibodies were identified, corroborating the diagnosis of systemic vasculitis by the EULAR/PRINTO/PRES criteria 2010. This case report highlights the importance of suspecting the diagnosis of vasculitis in pediatric patients presenting systemic inflammation and multiorgan involvement of undetermined causes.

¹ Hospital da Criança de Brasília, Reumatologia Pediátrica - Brasília - Distrito Federal - Brasil.

² Hospital da Criança de Brasília, Pneumologia Pediátrica - Brasília - Distrito Federal - Brasil.

Endereço para correspondência:

Alice Leite Mesquita

Hospital da Criança de Brasília, Reumatologia Pediátrica - Brasília - Distrito Federal - Brasil. Av. L2 Sul, Quadra 608 Módulo a, Brasília, DF, 70203-900.

E-mail: alicesh@rocketmail.com / aliceleitemesquita@gmail.com



INTRODUÇÃO

Granulomatose com poliangiite (GPA), previamente conhecida como granulomatose de Wegener, é vasculite necrotizante de pequenos vasos, tipicamente associada com granulomas inflamatórios, glomerulonefrite, envolvimento do trato respiratório superior e inferior e presença de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)¹. É a principal vasculite associada ao ANCA, com incidência 0.4 a 6.4 casos para 1.000.000 crianças, em coortes internacionais, oriundas da Europa e Estados Unidos².

Apesar de rara, uma coorte brasileira demonstrou que 12,4% dos adultos diagnosticados com GPA apresentavam comprometimento na faixa etária pediátrica³, evidenciando a importância da suspeição e reconhecimento da doença ainda na infância. Por vezes o diagnóstico é confundido inicialmente com doenças mais prevalentes (infecciosas, neoplásicas e otorrinolaringológicas), de modo que a confirmação pode se dar tardiamente⁴.

Objetiva-se relatar um caso de GPA em uma adolescente, diagnosticada inicialmente com fusariose. Para isso, foram utilizados critérios classificatórios estabelecidos por *European League Against Rheumatism (EULAR)/ Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO)/ Paediatric Rheumatology European Society (PRES)* em 2010⁵. Este trabalho foi aprovado sob número de certificado de apresentação de apreciação ética (CAAE): 85703325.4.0000.0144.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo feminino, previamente hígida, 13 anos de idade, admitida em unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica devido à insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. Menor apresentava tosse hemoptoica, dispneia progressiva, febre intermitente e perda ponderal de início há 5 meses. Havia registro de internação em hospital externo há 2 meses com uso prévio de oxacilina, ceftriaxona e cefepime, além de investigação negativa para tuberculose (teste tuberculínico não reator, baciloscopia, teste rápido molecular – TRM-TB – e cultura para fungos negativos no lavado broncoalveolar - LBA). Paralelamente à prévia hospitalização, surgiu nódulo flogístico em região glútea à esquerda que fora biopsiado e tratado com amoxicilina-clavulanato, sem resposta.

À admissão, tomografia computadorizada (TC) de tórax demonstrou nódulos pulmonares difusos e adenomegalia mediastinal. Laboratorialmente havia aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS) 75mm/h, proteína C-reativa (19mg/dL), leucograma 14.670 células/ μ L e anemia (hemoglobina 10mg/dL) normocítica e normocrômica, com provas de hemólise e teste de Coombs direto negativos. Considerando a possibilidade de doença fúngica, foram

iniciados empiricamente afotericina B lipossomal, cefepime, levofloxacino e sulfametoxazol/trimetoprima. Sorologia anti-HIV resultou negativa, bem como hemoculturas para bactéria e fungos. Apesar destas negativas, mediante a suspeita de embolia séptica, ecocardiograma foi realizado, com resultado normal.

Após 10 dias, a paciente evoluiu com resolução da febre, decréscimo de provas de atividade inflamatória e tolerou extubação. Ao despertar, queixou-se de dor intensa em membro inferior esquerdo e evoluiu com epistaxe. TC de seios da face evidenciou pansinusopatia. Devido à suspeita de trombose venosa profunda (TVP), ultrassonografia (USG) Doppler de membro acometido não detectou TVP. Em decorrência de persistência da dor, foi solicitada eletroneuromiografia que identificou comprometimento neuropático do nervo ciático, sendo prescrita gabapentina. E, também, para complementação diagnóstica, realizada ressonância magnética de neuroeixo sem alterações.

Tão logo houve estabilidade clínica, novo LBA foi coletado, com resultado de segundo TRM-TB e pesquisa de galactomanana negativos. A pesquisa micológica direta visualizou leveduras hialinas e, posteriormente, recebemos resultado de cultura para fungos positiva para *Fusarium* spp. A avaliação imagenológica da região glútea foi indicativa de celulite infecciosa associada a miosite do glúteo máximo (Figura 1), também atribuídas à provável infecção fúngica.

Cerca de 40 dias após admissão, a paciente recebeu alta com seguimento ambulatorial, em uso de voriconazol e gabapentina. Duas semanas depois, reiniciou tosse hemoptoica e febre, necessitando de reinternação, em que nova TC de tórax (Figura 2) evidenciou áreas de cavitação difusas bilateralmente e RM de órbitas com dacriocistite à direita, determinando discreta proptose, além de sinusopatia do esfenóide, maxilar e etmoidal. Outra broncoscopia foi realizada, em que se identificou espessamento ao nível da carina e mucosa friável.

Para diagnósticos alternativos, solicitaram avaliação da reumatologia após resultado de p-ANCA positivo 1:80. Além deste, houve positividade do Fator Antinuclear (FAN) em título de 1:320 padrão nuclear pontilhado fino, anticoagulante lúpico e antimieloperoxidase (MPO) reagentes. A pesquisa de autoanticorpos anti-DNA dupla hélice, c-ANCA, anti-Ro, anti-La, anti-Scl-70, anticardiolipinas e anti-B2-glicoproteína I resultou negativa. Para investigação de sarcoidose, a dosagem da enzima conversora da angiotensina (ECA) também evidenciou resultado normal.

Durante a reinternação, foi obtido laudo de biópsia cutânea de glúteo, indicando paniculite com infiltrado celular misto associada à necrose granulomatosa, que, em conjunto à avaliação reumatológica, corroborou o diagnóstico de vasculite associada ao ANCA. Para contemplar a avaliação renal, foram obtidas relação proteinúria/creatinúria (P/C) em amostra isolada de urina de 0.6 e função renal, que se mostrou




Figura 1. Corte axial de ressonância magnética (sequência SPAIR) evidenciando realce subcutâneo de limites imprecisos (seta vermelha) estendendo-se à topografia do glúteo máximo à direita (seta azul), compatível com celulite associada à miosite.




Figura 2. Cortes axiais de tomografia de tórax evidenciando nódulos pulmonares cavitados (setas vermelhas).

preservada desde o início. No exame sumário de urina, não constavam elementos anormais e não havia alterações na sedimentoscopia.

Estabelecido o diagnóstico de GPA, a paciente recebeu pulsoterapia com metilprednisolona 30mg/kg por 3 dias consecutivos associada à infusão venosa de ciclofosfamida 750mg/m² de superfície corporal. Após 48 horas de corticoterapia, houve remissão da febre e decréscimo das provas de atividade inflamatória. A biópsia renal guiada por USG, realizada 2 semanas após pulsoterapia, com amostra de 29 glomerulos não mostrou alterações inflamatórias e apenas 1 esclerosado globalmente. Posteriormente ao procedimento, a paciente recebeu alta hospitalar em uso de prednisona 1.5mg/kg/dia, sulfametoxazol-trimetoprima, ácido acetil-salicílico, voriconazol, gabapentina, carbonato de cálcio e vitamina D.

DISCUSSÃO

Este caso demonstra a complexidade da jornada diagnóstica de uma adolescente que inicialmente apresentou febre, tosse hemoptoica e dispneia grave. Quando comparada à doença de início no adulto, a GPA pediátrica apresenta maior gravidade na primodescompensação, com maior necessidade de internação e suporte ventilatório⁴. Ademais, a doença na faixa etária pediátrica predomina em meninas, com média de início aos 14 anos⁶, ao passo que predomina em homens na maioridade².

Inicialmente, a paciente foi tratada com diferentes betalactâmicos, sob hipótese de pneumonia bacteriana, entretanto sem melhora, e posteriormente, submetida à investigação de tuberculose pulmonar, doença endêmica no Brasil, com diagnóstico descartado. A boa evolução clínica, após terapia antifúngica, associada ao crescimento de *Fusarium* spp. em cultura de LBA, bem como relato de nódulo glúteo, preliminarmente, corroboraram o diagnóstico de fusariose. Os fungos do gênero *Fusarium* são ubíquos e amplamente distribuídos no ar, solo e água, sendo as formas mais comuns de infecção superficiais (onicomicose e ceratite). Em se tratando de imunocomprometidos, mais suscetíveis às formas invasivas, a doença se manifesta predominantemente por pneumonia (vidro fosco e nódulos), bronquiectasias e lesões de pele similares a ectima⁷.

A progressão das lesões pulmonares para cavitação e recrudescência dos sintomas iniciais motivaram a busca por diagnósticos diferenciais após a reinternação. Os resultados de p-ANCA e anti-MPO reagentes foram decisivos para o diagnóstico, pois, após sua obtenção, foram contemplados critérios classificatórios suficientes (3/5). O padrão de autoanticorpos evidenciados no caso em tela não é o mais característico da GPA (c-ANCA e antiproteínase 3), contudo destaca-se que ANCA reagente de qualquer tipo basta como critério e pode ser encontrado em até 90% dos casos⁵.

Destaca-se que, caso houvesse acesso precocemente ao laudo de biópsia cutânea, é possível que a suspeita clínica e a confirmação também ocorressem antecipadamente. Ao final, foram contemplados todos os 5 critérios classificatórios⁵ de GPA: histopatológico de pele, envolvimento de via aérea superior (epistaxe e sinusopatia), traqueobrônquico (estenose traqueal), pulmonar (nódulos cavitados), renal (relação P/C > 0.3mg/mg) e positividade do ANCA. Apesar de tantos critérios encontrados, ressalta-se que as alterações mais comuns são renais (83%), pulmonares (74%), e de vias aéreas superiores (70%)².

A biópsia renal não corroborou o diagnóstico e uma possível justificativa foi a realização do procedimento posteriormente à pulsoterapia. O achado de glomerulonefrite pauci-imune e/ou necrotizante é consistente em 94% dos casos de GPA e é o maior determinante de morbimortalidade da doença⁶.

A maior coorte de GPA pediátrica demonstrou que a estenose subglótica é infrequente (10%), entretanto destaca-se em especificidade na doença de início na infância: cinco vezes maior quando comparada àquela em idade adulta. Sua inclusão nos critérios classificatórios EULAR/PRINTO/PRES reflete a relevância de tal lesão².

Embora não sejam critérios para GPA, tanto a dacriocistite quanto mononeurite de ciático foram atribuídas à doença. Alterações oculares sob a forma de conjuntivite, episclerite, massas retro-orbitais e proptose podem ocorrer em até 40%, enquanto as alterações neurológicas mais graves como neuropatia, acidente vascular encefálico e fraqueza muscular ocorrem em menos de 3%⁶.

O tratamento proposto seguiu as recomendações para GPA com gravidade do SHARE (*Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe*)⁸, inclusive no que diz respeito à terapia antiagregante profilática e sulfametoxazol-trimetoprima para profilaxia de *Pneumocystis jirovecii*. Devido à expectativa de imunossupressão prolongada, manteve-se profilaxia secundária para fusariose pulmonar.

CONCLUSÃO

O diagnóstico de vasculite primária em pacientes pediátricos é desafiador devido à sua ampla variedade de manifestações clínicas, que dependem da localização e extensão da doença, e à similaridade de apresentação de outras doenças. No caso em questão, as manifestações cutâneo-pulmonares inicialmente foram atribuídas em sua completude à infecção fúngica por *Fusarium* spp., porém o comprometimento de outros órgãos-alvo posteriormente, bem como o resultado de histopatológico e ANCA, foram cruciais para o diagnóstico. As vasculites devem ser consideradas como hipótese diagnóstica naqueles pacientes que se apresentem com inflamação sistêmica de origem inexplicada e/ou envolvimento multiorgânico.

REFERÊNCIAS

1. Bohm M, Gonzalez Fernandez MI, Ozen S, Pistorio A, Dolezalova P, Brogan P, et al. Clinical features of childhood granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis). *Pediatr Rheumatol Online J*. 2014;12:18. DOI: <https://doi.org/10.1186/1546-0096-12-18>.
2. Cabral DA, Morishita K. Antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis. In: Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn LR, Mellins ED, Fuhlbrigge RC, editors. *Textbook of paediatric rheumatology*. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021:484-97. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-24145-8.00036-3>.
3. Belem JMF, Pereira RMR, Perez MO, do Prado LL, Calich AL, Sachetto Z. Epidemiologic features of systemic vasculitides in the southeast region of Brazil: hospital-based survey. *J Clin Rheumatol*. 2020;26(7 Suppl 2):S106-10. DOI: <https://doi.org/10.1097/RHU.0000000000001041>.
4. James KE, Xiao R, Merkel PA, Weiss PF. Clinical course and outcomes of childhood-onset granulomatosis with polyangiitis. *Clin Exp Rheumatol*. 2017; [cited Year Month Day]; 35(Suppl 103):202-8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27749233/>.
5. Ozen S, Pistorio A, Iusan SM, Bakaloglu A, Herlin T, Brik R, et al. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: final classification criteria. *Ann Rheum Dis*. 2010;69(5):798-806. DOI: <https://doi.org/10.1136/ard.2009.116657>.
6. Cabral DA, Canter DL, Muscal E, Nanda K, Wahezi DM, Spalding SJ, et al. Comparing presenting clinical features in 48 children with microscopic polyangiitis to 183 children who have granulomatosis with polyangiitis (Wegener's): an ARChiVe cohort study. *Arthritis Rheumatol*. 2016;68(10):2514-26. DOI: <https://doi.org/10.1002/art.39729>.
7. Nucci M, Anaissie E. Invasive fusariosis. *Clin Microbiol Rev*. 2023;36(4):e00159-22. DOI: <https://doi.org/10.1128/cmr.00159-22>.
8. de Graeff N, Groot N, Brogan P, Ozen S, Avcin T, Bader-Meunier B, et al. European consensus-based recommendations for the diagnosis and treatment of rare paediatric vasculitides: the SHARE initiative. *Rheumatology (Oxford)*. 2019;58(4):656-71. DOI: <https://doi.org/10.1093/rheumatology/key322>.