Residência RP Pediátrica
Publicação Oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria

CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

Lesiones semejantes a la suciedad

Dirt-like lesions

Vânia Oliveira de Carvalho[1], Julienne Angela Ramires de Carvalho[2]

RELATO DEL CASO

Una chica de 11 con diagnóstico hiperinsulinismo en el periodo neonatal tratada con hormona de crecimiento recombinante y prednisona hasta los 7 años de edad. Desde entonces mantenida sin medicación y sin episodios de hipoglucemia. Hace 3 meses notó lesiones asintomáticas parduscas en los tobillos y dorso de los pies. Tiene condiciones de higiene adecuadas y refiere inúmeras tentativas de remoción, frotando con esponja, agua y jabón, sin éxito. Al examen presenta manchas hipercrómicas de color castaño claro intercaladas por área de piel de coloración normal en el dorso del pie y región retro maleolar interna (Figura 1 A y B). Después de sospecha del diagnóstico fue realizada remoción con alcohol isopropílico y las lesiones desparecieron (Figura1 C).

TERRA FIRMA-FORME

Terra firma-forme es una dermatosis que cursa con alteración de la coloración muy semejante a la suciedad en paciente con hábitos de higiene adecuados. Por el aspecto no estético puede causar problemas cosméticos, inclusive con Bulling[1].

La limpieza con agua y jabón es capaz de retirar suciedad, pero no quita Terra firma-forme. La limpieza realizada con presión firme de una gasa embebida en alcohol isopropílico quita esta condición y caso recurra este procedimiento podrá ser repetido. En la recurrencia frecuente la limpieza con alcohol puede ser mantenida una vez en la semana durante algunos meses.



Figura 1. Manchas hipercrómicas de color castaño claro (A y B); desaparecimiento de las lesiones (C).

Ante a esa sospecha diagnóstica la tentativa de remoción con alcohol se podrá realizar en el consultorio. Se trata de una descoloración determinada por hiperqueratosis localizada de causa desconocida[2]. Resulta de la maduración retardada de los queratinocitos lo que retiene la melanina y acumula sebo, sudor y microorganismos.

[1] Profesora Adjunta del Departamento de Pediatría Sector de Dermatología Pediátrica - Universidad Federal de Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
[2] Profesora Adjunta del Departamento de Pediatría Sector de Endocrinología Pediátrica - Universidad Federal de Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Dirección:
Vânia Oliveira de Carvalho.
Universidade Federal do Paraná. Rua Richard Strauss, nº 62, Vista Alegre. Curitiba - Paraná. Brasil. CEP: 80820-110. E-mail: rcarvalho50@hotmail.com

Residência Pediátrica 2016;6(3):129-130.

La evaluación histológica es innecesaria, pero si realizada habrá acantosis, papilomatosis e hiperqueratosis laminar[3]. Es más frecuente en niños y adolescentes y se localiza en el cuello, tobillos y cara[4]. Cuando localizada en el cuello puede confundirse con *acantosis nigricans*, con posibilidad de investigaciones innecesarias[2]. Es importante reconocer esta dermatosis para evitar procedimientos terapéuticos y diagnósticos innecesarios y tranquilizar a adolescentes y familiares.

REFERENCIAS

1. Browning J, Rosen T. Terra firma-forme dermatosis revisited. Dermatol Online J. 2005;11(2):15.
2. Ratcliffe A, Williamson D, Hesseling M. Terra Firma-Forme Dermatosis: it's easy when you know it. Arch Dis Child. 2013;98(7):520. PMID: 23413311 DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2012-303499
3. Moon J, Kim MW, Yoon HS, Cho S, Park HS. A Case of Terra Firma-Forme Dermatosis: Differentiation from Other Dirty-Appearing Diseases. Ann Dermatol. 2016;28(3):413-5. DOI: http://dx.doi.org/10.5021/ad.2016.28.3.413
4. Berk DR. Terra firma-forme dermatosis: a retrospective review of 31 patients. Pediatr Dermatol. 2012;29(3):297-300. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1470.2011.01422.x