



RESIDÊNCIA PEDIÁTRICA

CASO CLÍNICO INTERATIVO

Caso clínico interativo

Bianca Carareto Alves Verardino¹; Ana Carolina Botelho de Barros¹; Mauro Cesar Dufrayer¹; Mariana Franco Mitidieri¹; Maraisa Facchini Spada¹; Luisa de Oliveira Zagne¹; Juliana de Paula Copio Silva¹; Jaqueline Elaine Luiz Fernandes¹; Ana Paula Albergaria Correa do Carmo¹; Simone Natalina Xavier²

Pré-escolar, 4 anos, natural e procedente do Rio de Janeiro, RJ.

Apresentava havia cerca de 4 meses queixa de dor em joelhos, que piorava ao subir escadas. Há aproximadamente um mês, brincando com seus primos, iniciou quadro de dor intensa em região lombar e posição antálgica mantida.

Avó refere febre diária e perda ponderal não aferida. Evacuava com dificuldade.

Encaminhado ao ambulatório de reumatologia para investigação diagnóstica.

Para investigação foram realizados:

- radiografia de tórax: sem alterações
- radiografia de coluna: redução do espaço intervertebral entre L3-L4
- ressonância magnética toraco-lombar (Figura 1)
- teste tuberculínico (PPD): enduração de 25 mm

Iniciou esquema RIP (rifampicina, isoniazida, pirazinamida) apresentando no terceiro dia de tratamento vômitos em grande volume e cefaleia. Realizada ressonância magnética do encéfalo (Figuras 2 e 3).

Apresentou boa evolução após adequação do esquema RIP e início de corticoide sistêmico, sem sequelas.

TUBERCULOSE VERTEBRAL

A tuberculose vertebral é uma das doenças mais antigas da humanidade, sendo descrita em múmias do ano 3400 AC. A doença também é conhecida por Mal de Pott, pois foi descrita por Sir Percival Pott, em 1779.

A tuberculose vertebral é uma forma destrutiva da doença, responsável por cerca de 50% dos casos de tuberculose musculoesquelética. Pode ocorrer em qualquer idade, incluindo o período neonatal, como manifestação de tuberculose congênita¹. Tuberculose pulmonar concomitante é frequente em pacientes com tuberculose espinhal. Cinquenta(50%) a 60% dos pacientes com tuberculose óssea e 67% dos paciente com Tuberculose pulmonar concomitante



Figura 1. RM de coluna lombar. Redução do espaço discal L3-L4. Irregularidade do platô inferior de L3.

é frequente em tuberculose espinhal; 50% a 60% dos casos de tuberculose óssea e 67% dos pacientes com tuberculose vertebral têm tuberculose pulmonar associada ou história pessoal de tuberculose².

A sua real incidência e prevalência é desconhecida, mas é indiscutivelmente maior em países no qual a tuberculose é endêmica, como o Brasil. Aproximadamente 10% dos pacientes com tuberculose extrapulmonar têm envolvimento ósseo, sendo a coluna vertebral o sítio mais acometido (50% dos casos), seguida do quadril e joelhos.

¹ Residentes de Pediatria do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPMG - UFRJ).

² Médica do IPPMG-UFRJ. Chefe de Enfermaria.




Figura 2. RM de encéfalo. Realce meníngeo.




Figura 3. RM de encéfalo. Imagens nodulares em cerebello.

O envolvimento vertebral resulta da disseminação hematogênica do *Mycobacterium tuberculosis*. A infecção primária é geralmente pulmonar ou, excepcionalmente, genitourinária. Caracteristicamente ocorre destruição do disco intervertebral e de suas adjacências, colapso de seus elementos e escorregamento anterior das vértebras levando à giba. Os sítios preferenciais de acometimento são a coluna torácica baixa e lombar.

A paraplegia é a complicação mais temida da tuberculose vertebral e também pode ser nomeada paraplegia de Pott e classificada em dois grupos:

recente: presente no estágio ativo da doença, causada por debris, pus, tecido de granulação decorrentes de destruição óssea, com bom prognóstico.

- tardia: é uma complicação neurológica e desenvolve-se em período variável (até 20 a 30 anos após infecção) e está associada à deformidade espinhal.

As características clínicas da tuberculose espinhal são: dor local, espasmo muscular, abscesso, giba e deformidade espinhal. O abscesso frio desenvolve-se lentamente enquanto a infecção estende-se aos tecidos adjacentes, sendo caracterizado pela ausência de dor e outros sinais inflamatórios^{1,2}.

A evolução da doença é lenta e insidiosa. Sua duração varia de meses a anos (média de 4 a 11 meses). Os pacientes geralmente procuram atendimento médico quando os sintomas são graves.

O sintoma mais comum é dor na coluna, normalmente no local acometido. A dor piora com movimentação, tosse e levantamento de peso. Déficit neurológico é mais comum quando há envolvimento torácico ou cervical. Formação de abscesso frio no entorno da lesão vertebral é uma apresentação comum e pode atingir grandes proporções, incluindo a região retrofaríngea (acometimento cervical), mediastino, traqueia, esôfago e pleura (acometimento torácico)².

Deformidade espinhal é uma característica marcante da doença e depende da região acometida. A gravidade dos sintomas depende da quantidade de vértebras acometidas.

O diagnóstico precoce é necessário para prevenir sequelas neurológicas permanentes e minimizar deformidades na coluna vertebral. Depende da presença de características clínicas e imagens radiológicas. A confirmação etiológica requer a demonstração de BAAR em biópsia ou cultura de material. Rastreamento de toda coluna deve ser realizado para afastar lesões não contíguas.

No diagnóstico diferencial da espondilite tuberculosa incluem-se as osteomielites piogênicas, sendo o principal agente etiológico o *Staphylococcus aureus*, seguido das Enterobacteriaceae^{3,4}.

As características radiológicas são: rarefação do platô vertebral, redução do espaço discal, destruição óssea. Muitas vezes, ocorre o acometimento de múltiplas vértebras. A imagem de vértebra em fuso é muito sugestiva.

A tomografia computadorizada demonstra alterações mais precocemente que a radiografia simples. O padrão de destruição óssea pode ser fragmentar (47%), osteolítico (34%), localizado e esclerótico (10%) ou subperiosteal (30%). Outros achados são: envolvimento de partes moles e abscesso paraespinhal^{1,2}.

A ressonância magnética é mais sensível que a radiografia simples e mais específica que a TC em relação ao diagnóstico e proporciona rapidez na determinação de envolvimento neurológico. Prontamente demonstra envolvimento do disco

vertebral, destruição do mesmo, abscesso, colapso vertebral, deformidades, edema, presença de lesões não contíguas^{3,5}.

Na cintilografia óssea não existe imagem patognomônica de tuberculose vertebral, no entanto, é útil na diferenciação de lesões metastáticas.

A confirmação etiológica se dá por meio de demonstração de BAAR ou evidência histológica em material de biópsia. No Brasil e especialmente na infância, o diagnóstico de tuberculose pode se dar por critérios epidemiológicos, clínicos e radiológicos^{2,8}.

O tratamento da tuberculose vertebral deve ser realizado com esquema básico 2RHZ/4RH para menores de 10 anos e 2RHZE/4RH para maiores de 10 anos, por 6 meses⁵⁻⁸.

Estudos de meta-análise não encontraram evidência que a utilização rotineira de tratamento cirúrgico e medicamentoso modifique o prognóstico do paciente com tuberculose vertebral. No entanto, em algumas circunstâncias a cirurgia parece ser benéfica e pode ser indicada. Os benefícios da cirurgia são: redução da cifose, alívio rápido da compressão nervosa e da dor, retorno precoce das atividades, menor índice de fusão óssea, menor perda óssea, recidivas menos frequentes.

Dois tipos de cirurgias podem ser realizadas: debridamento do tecido infectado associado ou não à estabilização da coluna vertebral.

O prognóstico geralmente é bom em pacientes sem deformidades ou déficit neurológico. Diversos estudos demonstram que 82-95% dos casos respondem à terapia medicamentosa isolada.

Perguntas:

1. O primeiro sinal radiográfico na tuberculose vertebral é:
 - a) Lesão lítica da região posterior do corpo vertebral.
 - b) Fusão dos corpos vertebrais.
 - c) Diminuição do espaço discal.
 - d) Lesão da região anterior do corpo vertebral.
 - e) Formação de abscesso perivertebral.
2. A osteomielite piogênica é um diagnóstico diferencial da espondilite tuberculosa. O principal agente etiológico é:
 - a) *Brucella melitensis*.
 - b) *Staphylococcus aureus*.
 - c) *Pseudomonas aeruginosa*.
 - d) *Salmonella enteritidis*.
 - e) *Staphylococcus epidermidis*.

3. No que concerne à tuberculose vertebral, qual das afirmativas é correta?
 - a) A tuberculose de coluna vertebral pode se manifestar em qualquer faixa etária, incluindo o período neonatal.
 - b) A maioria dos casos necessita de tratamento cirúrgico, além do tratamento quimioterápico.
 - c) Na espondilite tuberculosa não ocorre formação de abscessos paravertebrais.
 - d) A região mais frequentemente atingida é a região sacra.
 - e) Não ocorre na região cervical.
4. Segundo o Manual de Recomendações para Controle de Tratamento da Tuberculose no Brasil, no tratamento da tuberculose óssea recomenda-se:
 - a) o esquema RIPE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) para pacientes com idade inferior a 10 anos.
 - b) o tempo de tratamento de 9 meses (2 meses de ataque e 7 meses de manutenção).
 - c) o esquema RIP (rifampicina, isoniazida, pirazinamida) para os pacientes maiores de 10 anos.
 - d) o uso de corticosteroides durante dois meses, com retirada progressiva.
 - e) o tempo de tratamento de 6 meses.

REFERÊNCIAS

1. Kumar A, Ghosh SB, Varshney MK, Tripathi V, Khan SA. Congenital spinal tuberculosis associated with asymptomatic endometrial tuberculosis: A rare case report. *Joint Bone Spine*. 2008;75(3):353-5.
2. Fuentes Ferrer M, Gutiérrez Torres L, Ayala Ramírez O, Rumayor Zarzuelo M, del Prado González N. Tuberculosis of the spine. A systematic review of case series. *Int Orthop*. 2012;36(2):221-31.
3. Moon MS, Kim SS, Lee BJ, Moon JL, Moon YW. Surgical management of severe rigid tuberculous kyphosis of dorsolumbar spine. *Int Orthop*. 2011;35(1):75-81.
4. Guérado E, Cerván AM. Surgical treatment of spondylodiscitis. An update. *Int Orthop*. 2012;36(2):413-20.
5. Nijs RN. Spinal tuberculosis. *Lancet*. 2011;378(9807):e18.
6. Merino P, Candel FJ, Gestoso I, Baos E, Picazo J. Microbiological diagnosis of spinal tuberculosis. *In Orthop*. 2012;36(2):233-8.
7. De Santo J, Ross JS. Spine infection/inflammation. *Radiol Clin North Am*. 2011;49(1):105-27.
8. Conde MB, Melo FAF, Marques AMC, Cardoso NC, Pinheiro, VGF, Dalcin PTR, et al. III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. *J Bras Pneumol*. 2009;35(10):1018-48.